

### 3.2. Kälberkrankheiten



- Saugschwäche
- Nabelentzündung
- Durchfall



---

---

---

---

---

---

---

---

### Fehlender Saugreflex



---

---

---

---

---

---

---

---

### Kalb mit Nabelentzündung



---

---

---

---

---

---

---

---

### Flüssigkeitsverlust bei Durchfall

- Bei mittelschweren Durchfall:
  - Täglicher Wasserverlust ca. 10 % der Körpermasse (Kalb 40 kg ca. 4 Liter)
- Bei schwerem wässrigem Durchfall:
  - Täglicher Wasserverlust bis ca. 20 % der Körpermasse (Kalb 40 kg ca. 8 Liter)
- Flüssigkeitsverlust MUSS kompensiert werden (Elektrolyte)!
- Übersäuerung + Energie

---

---

---

---

---

---

---

---

### Hilfe zur Mittelfindung

- Modalitäten > / <
- Art und Weise wie der Kot abgesetzt wird
  - Im Strahl oder rinnt er einfach die Beine hinunter
- Mit oder ohne Drang nach Kotabsatz
- Kotbeschaffenheit
  - Farbe, Geruch, Konsistenz und Reizung der Haut
- Schwächerer oder nicht schwächerer Durchfall

---

---

---

---

---

---

---

---

### A-Z

- Durchfall
- Erschöpfung
- Blähungen
- Darmvorfall
- Kolik
- Verstopfung
- Fieber
- Schmerzen
- Seelische Beschwerden

---

---

---

---

---

---

---

---

### Beispiel Kryptosporidien

- Durchfall ab dem 4. Lebenstag
- 2Tage dünnflüssig, heller Kot
  - Riesige Mengen an Kot
- Ab 6. Lebenstag werden sie schwach, trinken gar nichts mehr, trocknen aus, liegen fest, aber immer noch Ausscheidung von grossen Mengen Kot
- Kryptosporidien nachgewiesen, Halocur möchte LW aber nicht geben

---

---

---

---

---

---

---

---

### Beispiel Kryptosporidien

- Massnahmen am 1./2. Tag
- Massnahmen bei beginnendem Durchfall (4. Tag)
- Massnahmen bei Schwäche
- Flankierende Massnahmen

---

---

---

---

---

---

---

---